


Вътрешни паразити?
Нямат шанс!

Ние използваме Cestall cat






Защо трябва да обезпаразитявам моята котка?

Котките, които са опаразитени, обикновено не показват клинични признаци. Редовното разпространение на яйца и глисти от заразени животни, обаче застрашава здравето на други животни, както и вашето. Затова лечението на любимата ни котка служи за превенция и на заболявания по хората. Малките деца са особено застрашени, защото все още нямат изградена лична хигиена.

Най-често срещаните чревни паразити при котката



Тения в тънките черва на котка
(2-3 mm)*

Възрастните форми на тения при кучета и котки обикновено не причиняват клинични признаци. Членчетата на *Dypilidium caninum* обаче, активно излизат от ануса и причиняват сърбеж, който може да е причина за „периаанално триене“.

*Снимките на паразити са направени в Катедра по паразитология на Central Veterinary Institute, Будапеща, Унгария.

Яйцата на тенията *Echinococcus multilocularis* могат да се развият и при хората. Жизнеспособните ларви се намират в т.нар. хидатидни кисти в различни органи като черен дроб, бели дробове, мозък или бъбреци.

Причиняват сериозни клинични признаци и дори смърт при хората.



Echinococcus multilocularis


Опаразитяване с кръгли червеи(глисти) се среща често при котенца и кученца. В тежки случаи може да се наблюдава подут корем, дъх на ацетон, тремор, гърчове.

При хората, като паратеничен гостоприемник, мигриращите ларви в белите дробове могат да причинят кашлица, която трудно се повлиява от лечение, а ако попаднат в очите се нарушава зрението и дори се стига до слепота.



Глисти в тънките черва на куче (2-18 cm)*

В случаи на тежко опаразитяване, може да се наблюдават гастроинтестинални признаци и дори анемия при котките. При хората може да се появи еритема (зачервяване) и сърбеж, поради проникване на ларви през кожата.



Анкилостоми в тънките черва на куче (0.5-2.5cm)*

Цестал кет дъвчащи таблетки: ефикасни и вкусни



- Ефикасни срещу най-често срещаните чревни паразити при котки
- Едно третиране е достатъчно при редовно обезпаразитяване
- 83% от котките поглъщат таблетката доброволно**

**LAV-C-0002-13

Правила за обезпаразитяване

1. Обезпаразитявайте вашия домашен любимец редовно, според указанията дадени от ветеринарен лекар.
2. За правилно дозиране, претеглете вашата котка предварително.
3. В идеалния случай, котенцата трябва да се обезпаразитят за първи път на 3 седмична възраст. Това се повтаря на всеки 2 седмици до отбиването. След това на всеки 4 седмици до навършване на 6 месечна възраст.
4. Бременни котки също трябва да се обезпаразитят.
5. Честотата на обезпаразитяване при възрастни котки се определя според цикъла на развитие на паразитите и средата, в която живее котката. Рискът от опаразитяване е по-висок при котки, които излизат често навън и ловуват.
6. Ако имате повече домашни любимци, препоръчително е да ги обезпаразитявате по едно и също време.



За по-подробна консултация, моля
попитайте Вашия ветеринарен лекар!

Съвети за опазване на човешкото здраве

- Обикновено, ние хората можем да се заразим с инфекциозни форми на паразитите чрез поглъщане или по-рядко през кожата.
- Измийте старателно ръцете си, след като сте пипали вашата котка.
- Сурови плодове и зеленчуци трябва да бъдат измити много добре. Ягоди или червени боровинки, набрани в гората, може да са замърсени с изпражнения на лисици, улични кучета и котки. Не ги яжте преди да бъдат добре измити!
- Не пийте вода от естествени извори, реки или езера.
- Не позволявайте на децата си да играят и тичат боси по места, които може да са замърсени с изпражнения.
- Пясъчник, който не се използва в момента трябва да бъде внимателно покрит.
- Оставяйте обувките си, с които излизате навън, до вратата, за да не пренесете някой паразит в дома си.
- Ако вие или някой от семейството ви има здравословни проблеми, споделете на вашия личен лекар, че имате домашен любимец.





Знаете ли, че?

- Паразитите се срещат много по-често, отколкото предполагате.
- Яйцата и ларвите им са невидими за окото.
- Микроскопско изследване на изпражненията може да разкрие дали вашия домашен любимец е опаразитен в момента.
- Котките могат да се заразят директно чрез: поглъщане на яйца и ларви, консумирайки вектори-преносители (мишки, бълхи, птици), вътре в утробата на майката, чрез кърма или през кожата.
- Сурово месо(свинско или говеждо) или вътрешности, също могат да бъдат източник на заразяване.
- Бълхите са междинен гостоприемник на тенията *Dipylidium caninum*, затова редовната употреба на препарати за външно обезпаразитяване като Vectra felis е препоръчителна.
- Лечението на текущо опаразитяване с тении или глисти не осигурява защита от бъдещо заразяване..
- Незрелите форми на паразитите оцеляват в изпражненията. Затова събирането и изхвърлянето на изпражнения, редовното почистване в развъдниците и местата, където лежи котката са от съществено значение.